

SCHEDA TECNICA

Florlis®

CONCIME PER PRATO E GIARDINO

Codice EAN: 8009985019559

CLASSIFICAZIONE: CONCIME CE - NPK (S) 20-10-10 (6)

COMPOSIZIONE: azoto (N) totale 20% di cui azoto (N) nitrico 9%, azoto (N) ammoniacale 11%; anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua e citrato ammonico neutro 10%, anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua 5%; ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua 10%; anidride solforica (SO₃) totale 6%; anidride solforica (SO₃) solubile in acqua 5%.

FORMULAZIONE: granulare.

CONFEZIONE: sacco da 6 kg (CONFEZIONE RIPSARMIO 4 kg + 2 kg)

COS'E': concime di origine minerale, granulare, di colore grigio.

AZIONI SVOLTE:

Azione nutritiva e rapida per il mantenimento del prato grazie ad un apporto completo ed equilibrato di nutrimento ai prati, ai campi sportivi e alle principali piante e fiori da giardino. Il giusto equilibrio tra azoto, fosforo e potassio garantisce una buona vegetazione e un irrobustimento radicale accrescendo la resistenza al calpestamento dei prati e il vigore vegetativo delle essenze del giardino.

VANTAGGI

La forma granulare del prodotto consente una distribuzione uniforme degli elementi nutritivi.

DOVE SI USA: prodotto ideale da utilizzare su ortaggi, piante da frutto, piante ornamentali verdi e da fiore, aiuole, alberi, siepi, cespugli, prati e piante in vaso.

USO E DOSI: distribuire il prodotto uniformemente sul terreno e successivamente innaffiare. Una manciata corrisponde a circa 30-40 g di prodotto.

- *Prato:* distribuire nella dose di 20 g per m² (mezza manciata) equivalenti a 2 kg per 100 m² e a 5 kg per 250 m²; trattare in primavera fino a tutto il mese di giugno a intervalli di 20 giorni. Per terreni poveri è raccomandabile ripetere la concimazione anche nel mese di settembre.
- *Giardino:* alberi (magnolia, conifere, ecc.), cespugli (forsizia, oleandro, ecc.), siepi (lauro, ligustro, ecc.), rosai: distribuire nella dose di 40÷80 g (1-2 manciate) per pianta a seconda della dimensione sulla superficie di proiezione della chioma; trattare in primavera a intervalli di 20 giorni; aiuole da fiore: distribuire 40 g per m² (circa 1 manciata); trattare dall'inizio della primavera a fine estate a intervalli di 20 giorni.

QUANDO SI USA:

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

In verde: concimare

In bianco: non trattare.

AVVERTENZE: le dosi riportate hanno valore indicativo in quanto dipendono dalle condizioni ambientali. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non ingerire. Le istruzioni sono idonee per l'uso indicato. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.